

Thiovit Jet®

C/PAP 81

L1107295 NORW/08B PPE 4188479

Thiovit Jet®



GROUP **M02** FUNGICIDE

SOPPMIDDEL

Giftig for insekter.
P261 Unngå innånding av støv/aerosoler.
P405 Oppbevares innelåst.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler).
Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).

UFI: W0HC-23FN-U00Q-3DY9

Behandlingsfrist
Jordbær: 7 dager. Solbær: 14 dager.
Bringebær: Før blomstring eller etter høsting.
Øvrige vekster: 4 dager.

REG. NR. 2007.30.14
Avgiftsklasse 2

Tilvirker
Syngenta Crop Protection AG
CH-4002 Basel, Sveits

Importør
Syngenta Nordics A/S
Strandlodsvej 44
2300 København S
Danmark
Tel. +45 32 87 11 00

20 KG

Product names marked ® or ™ - the ALLIANCE FRAME
the SYNGENTA Logo and the PAPIRORE ICON
are Trademarks of a Syngenta Group Company



Bruksrettleidingen må følges, slik at man unngår risiko for skade på menneskers helse og miljøet. Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist, eller å overskride den tillatte maksimale dosering/konsentrasjon.

BRUKSOMRÅDE

Kjernetrøtt og steinfukt på friland, Jordbær og bringebær på friland, veksthus og plasttunnel. Solbær i veksthus og på friland. Ert til modning, korsblomstra grønnfôrvekster, rotgrønnsaker, rotvekster, kålvekster og agurk på friland. Prydplanter i veksthus og på friland samt edelgran.

BEHANDLINGSFRIST

Jordbær: 7 dager. Solbær: 14 dager. Bringebær: Før blomstring eller etter høsting. Øvrige vekster: 4 dager.

VIKKEOMRÅDE

Thiovit Jet® virker mot mieldugg i kjernetrøtt, jordbær, korsblomstrede vekster, grønnssaker, blomster, roser og andre prydvækster samt mot skurv på eple og pære. Thiovit Jet® virker ikke mot Fusarium og Gloeosporium.
Thiovit Jet® gir god virkning mot bladmidd (galmidd) og skuddtoppmidd. Ved gentatte sprøytinger hemmer preparatet utviklingen av spormidd.

VIKKEMATE

Thiovit Jet® inneholder fipronil svovel i en gunstig partikkelstørrelse som sikrer en god fordeling på plantene. Det dannes et jevnt belegg som gjør at sopp og midd ikke får angrøpet og etablert seg. Thiovit Jet® virker forebyggende og sprøyting hindrer nye angrøp.

Nytteorganismer

Svovel er generelt skadelig overfor nyttesopp og voksne srytlevæps av *Encarsia formosa* og *Diplophus isala*. Overfor andre nyttesvekter og rovmidd kan svovel være lite til svært skadelig avhengig av behandlingsmetode. Humleboet bør fylles vak fra kulturen ved behandling med svovel. Ettervirkningen på humler er på 1% uke.

BRUKSRETTELING

Thiovit Jet® rens først ut med litt vann til en tykk vælling. Hell denne over i sprøytestanken under stadig omrøring idet tanken fylles med vann. Tilsetning av spredningsmiddel er unødvendig. Det er fare for svaksade ved sprøyting på varme dager og i solskin. I kaldt vær reduseres virkningen mot mieldugg.

Frukttrær

Mot skurv og mieldugg sprøytes etter værforholdene 1-3 ganger før og eventuelt etter blomstring. 400-750 g til 100 liter vann. Etter blomstring sprøytes 300-500 g til 100 liter vann.
For å skåne rovmidd ved integrert bekjempelse, må konsentrasjonen reduseres til 150-300 g til 100 liter vann, avhengig av sprøyteintervall. Mot bladmiddangrep i frukttrær sprøytes 2 ganger, tidlig 'tidlig' og 'begynnende blomstring', med 120-150 g til 100 liter vann (225-250 g per dekar). Ved sterke angrøp senere i sesongen bør behandlingen gjentas.

Jordbær i veksthus, plasttunnel og på friland:

Mot mieldugg sprøytes fra bladskylling og fram til blomstring med 10-12 dagens mellomrom, samt fra høsting og utover etter behov med 10-12 dagens mellomrom. Bruk 750 g i minst 100 liter vann per 1000 m² arealstørrelse. Det er viktig å få god dekning av høsting ved sprøytingen. Ved for høy kjernetrøttighet får man ikke "tøstet" sprøytevæske godt nok inn i bladmassen.

Bringebær på friland i tunnel og veksthus:

Ved angrøp af bringebarmidd. Sprøyt med 250-300 g Thiovit Jet®/100 liter vann 2-3 uker før blomstring og/eller om høsten, helst etter at de gamle stengene er fjernet. Svovel kan bli a. avhengig av sort og dosering, g. svaksader. Her må brukerne prøve seg fram. Bruk rikelig med væske (opptil 150 liter per daa ved mye bladverk) og sørg for god dekning av alle planteløker. Maks fire behandlinger per sesong.

Solbær i veksthus og på friland:

Ved små til moderate angrøp (innde om 6% av knoppene angrøpet). Sprøyt med 500-600 g Thiovit Jet®/100 liter vann før begynnelsen blomstring, når midten begynner spredningsaktivitet (se etter midd utenpå gallene med lupe, eller sprøyt når det har vært over 18-20 grader i et par dager). Gjenta ved videre blomstring og/eller 14 dager etter videre blomstring. Sprøyting etter høsting har ingen effekt, og sprøyting midt i blomstringen anbefales ikke. Svovel kan, b.a. avhengig av sort og dosering, g. svaksader på bladene. Her må brukerne prøve seg fram. Bruk rikelig med væske (opptil 150 l per daa ved mye bladverk) og sørg for god dekning av planteløker. Maks 3 behandlinger per sesong.

Korsblomstrede vekster og grønnssaker:

Mot mieldugg sprøytes 300 g per dekar ved fare for angrøp, utoverlig i kritiske perioder fram til høsting.

Prydvækster:

Mot mieldugg sprøytes 200-300 g til 100 liter vann på friland, eller 100 g til 100 liter vann i veksthus.
Bruk 200 g per 100 liter væske mot begynnelsen angrøp av skuddtoppmidd. Normal væskemengde til prydeplanter er vanligvis 100-200 liter sprøyteveske per daa avhengig av plantens vekstform. Endres væskemengden må konsentrasjonen endres tilsvarende. Behandlingen bør gjøres minst 2 ganger med 7 dagens mellomrom.
Vær oppmerksom på svovelintolerante kulturer som *Anthurum*, *Begonia*, bregner, sorter av *Chrysanthemum*, *Cissus*, *Cyclamen*, *Fuchsia*, *Geranium*, *Hydrangea*, *Impatiens*, *Kalanchoe*, *Lathyrus*, melk, *Primula*, sorter av roser, *Sanipaulie* og *Senecio*. Prøv først om et par planter tåler behandlingen på det aktuelle stedet.

Edelgran:

Mot galmidd sprøytes før brytning av knoppen i mai eller etter første juli med 400 g i 70-100 liter vann per dekar.

BLANDEBARHET

Thiovit Jet® må ikke blandes med oljeløstlige sprøytemidler.

FORSIKTIGHETSREGELER

Bruk vernehansker av polykonen og hodeklærne arbeidstøy ved håndtering og bruk av preparatet. Ved langvarig sprøyting og når det er fare for inndring av damp/pepyttelake, skal helmaske med kombispenfilter A1P3 brukes. Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes. Ved uheld eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftinformasjonen Rt. 22 59 13 00

RENGJØRING

Tomemballasjen skylles minst tre ganger med vann og innholdet tømtes i sprøytestanken. Rester fra sprøytestanken fornyes ondag 5 ganger med vann og skylles ut i henhold til bruksrettleidingen. Skyll sprøytestøyt med vann etter bruk på et sted som ikke gir avrenning til vann.

AVFALLSHÅNTERING

Rengjør emballasje bringes til lovlig avfallsanlegg. Plastemballasje kildesorteres. Konsentrerte preparaterester og ikke rengjort emballasje må innleveres til uttak for farlig avfall.

TAGNING

Oppbevares tørt og kjølig.

MERK

Vi garanterer at preparatet holder rett kvalitet. Dette innebærer ingen garanti for at preparatet under alle forhold får forventet virkning. Bruksanvisningen er basert på forsøk og erfaring. Hvis preparatet håndteres eller brukes på annen måte eller under andre vilkår enn angitt på etiketten bortfaller vårt ansvar ved eventuell skade.

For mere informasjon om produktet se vår hjemmeside www.syngenta.no

Registrerte varemerker
Syngenta Group Company: Thiovit Jet®



5 707239 400452

	DESCRIPTION: GUSSETED SACK 370 X 650 X 90MM - TRACE VERSION	DRAWING SCALE: 1:1	ISSUE Date: 03.11.2022	ISSUE No: SYNTR003	Please remove before printing. Retirez s'il vous plaît avant l'impression. Por favor, eliminar antes de imprimir.	241305
--	--	-----------------------	---------------------------	-----------------------	---	--------