



Vertimec®

syngenta®

INSEKTMIDDEL

GROUP 6 INSECTICIDE

INSEKTMIDDEL

Mot amerikansk blomstertrips, minerfluer, spinnmidd og dvergmidd (f.eks. skuddtoppmidd og cyclamenmidd), veksthusmellus og bomullsmellus i prydplanter i veksthus.

Mot jordbærmidd i jordbær på friland, i veksthus og plasttunnel.

Les alltid etiketten nøye før bruk.

1 L

Product names marked ® or ™, the ALLIANCE FRAME, the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON are Trademarks of a Syngenta Group Company

abamectin - emulsjonskonsentrat

Mot amerikansk blomstertrips, minerfluer, spinnmidd og dvergmidd (f.eks. skuddtoppmidd og cyclamenmidd), veksthusmellus og bomullsmellus i prydplanter i veksthus.

Mot jordbærmidd i jordbær på friland, i veksthus og plasttunnel.

Les alltid etiketten nøye før bruk.

Sammensetning: abamectin 18 g/l, 1-hexanol 25-35%, fyllstoffer 63-73%

ADVARSEL

H302 Farlig ved svelging.

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

Forårsaker skade på nervesystemet ved langvarig eller gjentatt eksponering.

H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Må ikke brukes nærmere vannforende grøfter, bekker, dammer eller større vannforekomster enn 30 m.

Giftig for møltemark.

Giftig for fugl.

Giftig for bier og andre insekter.

P261 Unngå innånding av aerosoler.

P301+P312 VED SVELGING: Kontakt et

GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.

P330 Skyll munnen.

P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre.

Fortsett skyllingen.

P337+P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

P405 Oppbevares innelåst.

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler).

Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).



UN3082

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS
SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
(ABAMECTIN)

UFI: 7R9A-121K-J00J-Y9VY

Behandlingsfrist:

Jordbær etter høsting.

Nettoinnhold: 1 L

Tilvirker

Syngenta Crop Protection AG, CH-4002 Basel, Sveits


Importør

Syngenta Nordics A/S

Strandlodsvej 44, 2300 København S, Danmark, Tel. +45 32 87 11 00

REG. NR. 2010.21.14

Avgiftsklasse 4



5 707239 400506



Vertimec®

Bruksrettlendningen må følges, slik at man unngår risiko for menneskers helse og miljøet. Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist, eller å overskride den tillatte maksimale dosering/konsentrasjon.

BRUKSOMRÅDE

Mot amerikansk blomstertrips, minerfluer, spinnmidd og dvergmidd (f.eks. toppskuddmidd og cyclamenmidd), veksthusmellus og bomullsmellus i prydplanter i veksthus. Mot jordbærmidd i jordbær på friland, i veksthus og plasttunnel. Behandlingsfrist: Jordbær etter høsting.

VIRKEOMRÅDE

Amerikansk blomstertrips, minerfluer, spinnmidd, dvergmidd (f.eks. skuddtoppmidd og cyclamenmidd), veksthusmellus og bomullsmellus og jordbærmidd.

VIRKEMÅTE

Vertimec® hemmer overføring av impulser mellom nerveceller og mellom nerveceller og muskelceller slik at insektene lammes og dør. I motsetning til mange andre insektsmidler så virker Vertimec® mot insekter som er resistente mot acetylkolinesterasehemmere (karbamater og fosformidler). Vertimec® har kontakt- og magevirkning mot bladlevende nymfer og minerfluelarver, men virker ikke på egg, jordboende stadier eller voksne. Larvene og nymfene slutter å spise kort tid etter behandling, men det kan ta 3-4 dager før full virkning sees. Midlet trenger inn i bladvevet (dybdevirkning), men er ikke systemisk.

NYTTEORGANISMER

Direkte kontakt med sprøytevæsken er farlig for pollinerende insekter og de fleste nyttedyr (rovmidd, rovtoger, gallmygg og snylteveps). Ettervirkningen er opptil 6 uker for rovtengen *Macrolophus caliginosus*. Abamectin er skånsomt mot jordboende rovmidd og nyttenematoder.

RESISTENS

Vertimec® inneholder abamectin, som tilhører middelgruppe 6: Avernemektiner og milbemyciner. Ensidig bruk av ett middel, eller en gruppe midler med samme biokjemiske virkemåte, kan føre til resistens eller en nedsatt følsomhet for midlet/middelgruppen. Det anbefales derfor å veksle mellom midler med forskjellige biokjemiske virkemåter og å bruke alternative bekjempelsesmetoder (der som dette finnes) i bekjempelsesprogrammet. Veksthusspinnmidd, amerikansk blomstertrips, veksthusmellus og bomullsmellus: For å forebygge resistensutvikling skal midler i gruppe 6: Avernemektiner og milbemyciner maksimalt brukes i 2 behandlingsblokker per år. Hver behandlingsblokk skal bestå av 1-2 behandlinger som skal utføres innenfor 1. generasjon av skadedyret.

BRUKSRETTLENDNING

Preparatet må ikke brukes på eller over blomstrende vegetasjon.

BRUKSOMRÅDE	DOSERING
Prydplanter: Behandling straks angrep oppstår. Preparatet sprøytes på plantemateriale med dysevanningssystem, lavtrykks- eller høytrykksprøyte. God dekking av plante-materiale er nødvendig for å få god effekt.	Bland ut 25-50 ml preparat pr. 100 l vann. Doseringen skal ligge mellom 50 og 150 liter sprøytevæske per daa avhengig av størrelsen på kulturen. Fjerning av knopper og blomster og beskjæring av bladverket før behandling vil sannsynligvis gi bedre effekt av midlet. Behandlingen gjentas etter behov (minimum 7 dagers mellomrom). For å redusere risikoen for resistensutvikling skal Vertimec® brukes kun 2 ganger per vekstsesong. Se resistensavsnittet vedr. antall behandlinger.

INSEKTMIDDEL

BRUKSOMRÅDE	DOSERING
Jordbær på friland, i veksthus og plasttunnel: Mot jordbærmidd sprøytes etter siste høsting i vekstsesongen. Gjenta sprøytingen 7-10 dager senere.	100-120 ml/daa i 100 liter vann. Sørg for god dekning av sprøytevæske på bladverket med sprøyte-trykk på 8-10 bar. Det anbefales å tilsette klebemiddel for at sprøytevæsken skal trenge ordentlig inn blant de hårete bladene. Vertimec® bør kun brukes 2 ganger per vekstsesong. Det anbefales å veksle med andre midler med annen virkemekanisme for å unngå resistens (se resistensavsnittet).

FORSIKTIGHETSREGLER

Bruk vernehansker av polykloropren e.l., øyevern og overtrekksdress ved håndtering og bruk av preparatet. Ved langvarig sprøyting og når det er fare for innånding av damp/sprøyetåke, skal helmaske med kombinasjonsfilter A1/P3 brukes. Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk. Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes. Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00.

HÅNTERINGSFRIST

Anbefalt vernetstyr må nyttes dersom en går inn i behandlet område i en periode på 24 timer etter sprøyting. Bruk forkle og lange hansker ved all håndtering av fuktige, behandlede plantedeler.

RENGJØRING

Tomemballasjen skylles minst tre ganger med vann og innholdet tømmes i sprøytetanken. Rester fra sprøytetanken fortynnes om lag 5 ganger med vann og sprøytes ut i henhold til bruksrettlendningen. Skyll sprøyteutstyr med vann etter bruk på et sted som ikke gir fare for forurensning av vannforekomster. Ved skifte av preparat for sprøyting i ømfintlige kulturer må sprøyteutstyret rengjøres med soda, salmiakk eller annet anbefalt vaskemiddel.

AVFALLSHÅNTERING

Rengjort emballasje bringes til lovlig avfallsanlegg. Plastemballasje kildesorteres. Konsentrerte preparatresten og ikke rengjort emballasje må innleveres til mottak for farlig avfall.

OPPBEVARING

Oppbevares tørt og frostfritt i lukket originalemballasje.

MERK

Vi garanterer at preparatet holder rett kvalitet. Dette innebærer ingen garanti for at preparatet under alle forhold har forventet virkning. Bruksanvisningen er basert på forsøk og erfaring. Hvis preparatet håndteres eller brukes på annen måte eller under andre vilkår enn angitt på etiketten bortfaller vårt ansvar ved eventuell skade.

Registrerte varemerker

For mere informasjon om produktet se vår hjemmeside www.syngenta.no
Syngenta Group Company: Vertimec®



Vertimec®

syngenta®

INSEKTMIDDEL

GROUP 6 INSECTICIDE

INSEKTMIDDEL

Mot amerikansk blomstertrips, minerfluer, spinnmidd og dvergmidd (f.eks. skuddtoppmidd og cyclamenmidd), veksthusmellus og bomullsmellus i prydplanter i veksthus.

Mot jordbærmidd i jordbær på friland, i veksthus og plasttunnel.

Les alltid etiketten nøye før bruk.

1 L

Product names marked ® or ™, the ALLIANCE FRAME, the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON are Trademarks of a Syngenta Group Company

abamectin - emulsjonskonsentrat

Mot amerikansk blomstertrips, minerfluer, spinnmidd og dvergmidd (f.eks. skuddtoppmidd og cyclamenmidd), veksthusmellus og bomullsmellus i prydplanter i veksthus.

Mot jordbærmidd i jordbær på friland, i veksthus og plasttunnel.

Les alltid etiketten nøye før bruk.

Sammensetning: abamectin 18 g/l, 1-hexanol 25-35%, fyllstoffer 63-73%

ADVARSEL

H302 Farlig ved svelging.

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

Forårsaker skade på nervesystemet ved langvarig eller gjentatt eksponering.

H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Må ikke brukes nærmere vannførende grøfter, bekker, dammer eller større vannforekomster enn 30 m.

Giftig for meitemark.

Giftig for fugl.

Giftig for bier og andre insekter.

P261 Unngå innånding av aerosoler.

P301+P312 VED SVELGING: Kontakt et

GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.

P330 Skyll munnen.

P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre.

Fortsett skyllingen.

P337+P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

P405 Oppbevares innelåst.

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler).

Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).



UN3082

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS
SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
(ABAMECTIN)

UFI: 7R9A-121K-J00J-Y9VY

Behandlingsfrist:

Jordbær etter høsting.

Nettoinnhold: 1 L

Tilvirker

Syngenta Crop Protection AG, CH-4002 Basel, Sveits

Importør

Syngenta Nordics A/S

Strandlodsvej 44, 2300 København S, Danmark, Tel. +45 32 87 11 00

REG. NR. 2010.21.14

Avgiftsklasse 4



5 707239 400506