

**SOPPMIDDEL**

syngenta.

**GROUP 4 FUNGICIDE****SOPPMIDDEL**

Til beising mot soppsykdommer på frø av grønnsaker som dyrkes i veksthus eller forkultiveres i veksthus og senere plantes ut på friland, beising av setteløk og blomsterløk samt til bekjempelse av algesopper (*Pythium* og *Phytophthora*) på prydplanter i veksthus.

Les alltid etiketten nøye før bruk.

**Metalaksyl-M - emulsjon til beising**

Til beising mot soppsykdommer på frø av grønnsaker som dyrkes i veksthus eller forkultiveres i veksthus og senere plantes ut på friland, beising av setteløk og blomsterløk samt til bekjempelse av algesopper (*Pythium* og *Phytophthora*) på prydplanter i veksthus.

Les alltid etiketten nøye før bruk.

**Sammensetning:** Metalaksyl-M 339 g/l, Fyllstoffer 750 g/l

**ADVARSEL**

- H302 Farlig ved svelging.  
H319 Gir alvorlig øyeirritasjo.  
H372 Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.  
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.  
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.  
P261 Unngå innånding av aerosoler.  
P305+P351 VED KONTAKT MED ØYENENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter.  
+P338 Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.  
P337+P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.  
P405 Oppbevares innelåst.  
P501 Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsanlegg.  
Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler).  
Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).  
Kan forårsake grunnvannsforurensning.



UFI: Q21D-K5M0-Y006-HPEP

**Nettoindhold: 1 L****Tilvirker**

Syngenta Crop Protection AG  
CH-4002 Basel, Sveits

**Importør**

Syngenta Nordics A/S  
Strandlodsvej 44, 2300 København S, Danmark  
Tel. +45 32 87 11 00

**REG. NR. 2022.2**  
Avgiftsklasse 2

5 707239 400377

L1107123 NORW/08B PPE 4188291

**1 L**

Product names marked ® or ™, the ALLIANCE FRAME  
the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON  
are Trademarks of a Syngenta Group Company

L1107123 NORW/08B PPE 4188291

Bruksrettleidingen må følges, slik at man unngår risiko for menneskers helse og miljøet. Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist, eller å overskride den tillatte maksimale dosering/konsentrasjon.

## BRUKSOMRÅDE

Til beising mot soppsykdommer på frø av grønnsaker som dyrkes i veksthus eller forkultiveres i veksthus og senere plantes ut på friland, beising av setteløk og blomsterløk samt til bekjempelse av algesopper (*Pythium* og *Phytophthora*) på prydplanter i veksthus.

## VIRKEMÅTE

APRON® XL inneholder det systemiske og selektive fungicidet metalaksyl-M. APRON® XL er spesielt formulert for beising mot jord- og frøsmitte.

Det inneholder klebemiddel for at det skal heftes godt på frø og setteløk. Det inneholder også et fiolett fargestoff for å unngå forveksling mellom beiset og ubeiset vare.

## BRUKSRETLEIING

### Frøbeising

BRUKSOMRÅDE	DOSERING
Frø av korsblomstrå jordbruksvekster, bete og grønnsaker unntatt bønner	Bruk 1-1,5 ml APRON® XL pr. kg frø til storfrøet planteslag og 1,5-2 ml pr. kg frø til småfrø (kepaløk, gulrot, korsblomstrede planteslag m.fl.).
Våtbeising av setteløk og blomsterløk	Bruk 200 ml APRON® XL til 100 liter vann. Dypp løken i 15 minutter like før setting. Væskeforbruk: 7-10 liter pr. 100 kg.
Algesopper på prydplanter i veksthus.	Bruk 4-7 ml APRON® XL i 100 liter vann. Væsken tilføres ved utvanning av 40-60 ml pr. potte (10-14 cm i diameter). Skade som følge av behandling er kjent i visse prydplanter, spesielt ved bruk av høye doser. Det anbefales derfor å prøvebehandle et mindre areal og å observere virkningen i minst 2 uker før et større areal av en ny kultur behandles. Ved høyt infeksjonstrykk kan behandlingen gjentas etter 8-12 uker. På grunn av fare for resistensutvikling skal ikke APRON® XL brukes mer enn 2 ganger i vekstsesongen.

Beising av ertefrø må utføres som vellingbeising: 100-150 ml APRON® XL røres ut i 0,3-0,5 liter vann: Vellingen tilføres 100 kg ertefrø under stadig omrøring. Også andre frøslag kan vellingbeises. For at frøet skal beholde lagringsevnen må det da tørkes etterpå. Tidligere APRON-beiset frø kan etterpå fuktbeises med skadedyrmiddel.

## FORSIKTIGHETSREGLER

Benytt vernehansker av polykloropren, øyevern og overtrekksdress ved håndtering og bruk av preparatet. Ved fare for innånding av preparatet under håndtering og bruk, og ved rengjøring av beiseutstyr, skal helmaske med kombinasjonsfilter A1/A2 benyttes. Støvfilter P2 må benyttes ved håndtering av beiset såvare. Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk. Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes. Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftinformasjonen tlf. 22591300.

## AVFALLSHÅNDTERING

Rengjort emballasje bringes til lovlig avfallsanlegg. Plastemballasje kildesorteres. Konsentrerte preparatrestre og ikke rengjort emballasje må innleveres til mottak for farlig avfall. Ubenyttet beiset vare må innleveres til mottak for farlig avfall.

## LAGRING

APRON® XL lagres frostfritt. Beiset frø bør ikke lagres lenger enn 1 år.

## MERK

Vi garanterer at preparatet holder rett kvalitet. Dette innebærer ingen garanti for at preparatet under alle forhold har forventet virkning. Bruksanvisningen er basert på forsøk og erfaring. Hvis preparatet håndteres eller brukes på annen måte eller under andre vilkår enn angitt på etiketten bortfaller vårt ansvar ved eventuell skade.

For mere informasjon om produktet se vår hjemmeside [www.syngenta.no](http://www.syngenta.no)

**Registrerte varemerker**  
Syngenta Group Company: APRON®



syngenta.

## GROUP 4 FUNGICIDE

## SOPPMIDDEL

Til beising mot sopp sykdommer på frø av grønnsaker som dyrkes i veksthus eller forkultiveres i veksthus og senere plantes ut på friland, beising av setteløk og blomsterløk samt til bekjempelse av algesopper (*Pythium* og *Phytophthora*) på prydplanter i veksthus.

Les alltid etiketten nøye før bruk.

L1107123 NORW/08B PPE 4188291

1 L

Product names marked ® or ™, the ALLIANCE FRAME the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON are Trademarks of a Syngenta Group Company

## Metalaksyl-M - emulsjon til beising

Til beising mot sopp sykdommer på frø av grønnsaker som dyrkes i veksthus eller forkultiveres i veksthus og senere plantes ut på friland, beising av setteløk og blomsterløk samt til bekjempelse av algesopper (*Pythium* og *Phytophthora*) på prydplanter i veksthus.

Les alltid etiketten nøye før bruk.

**Sammensetning:** Metalaksyl-M 339 g/l, Fyllstoffer 750 g/l

## ADVARSEL

- H302 Farlig ved svelging.  
 H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.  
 H372 Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.  
 H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.  
 P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.  
 P261 Unngå innånding av aerosoler.  
 P305+P351 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter.  
 +P338 Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.  
 P337+P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.  
 P405 Oppbevares innelåst.  
 P501 Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsanlegg.
- Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler).  
 Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).  
 Kan forårsake grunnvannsforurensning.



UFI: Q21D-K5M0-Y006-HPEP

REG. NR. 2022.2  
Avgiftsklasse 2

Nettoindhold: 1 L

## Tilvirker

Syngenta Crop Protection AG  
CH-4002 Basel, Sveits

## Importør

Syngenta Nordics A/S  
Strandlodsvej 44, 2300 København S, Danmark  
Tel. +45 32 87 11 00



5 707239 400377

L1107123 NORW/08B PPE 4188291