

### Azoksystrobin - suspensjonskonsentrat

Mot soppsykdommer på høst- og vårhvete, bygg, rug og rughvete, potet, kepaløk, sjalottløk, vårløk, purre, gulrot, persillerot, kruspersille (friland), bladpersille, pastinakk, stangselleri, knollselleri, blomkål, brokkoli, hodekål, rosenkål, grønnkål, kinakål, ruccola, kålrot, nepe, salat på friland, rødbete, reddik, sukkerbete, forbete, ert til konserver, sukkererter, erter til modning, bønner, frilandsagurk, raps, rybs samt jordbær og bringebær på friland, plasttunnel og i veksthus.

Les alltid etiketten nøye før bruk.

**Sammensetning:** Azoksystrobin 250 g/l, fyllstoffer 840 g/l



**UN3082**

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE,  
LIQUID, N.O.S., (AZOXYSTROBIN)

#### ADVARSEL

Inneholder 1,2-benzisothiazol-3-one. Kan gi en allergisk reaksjon.

Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Må ikke brukes nærmere vannførende grøfter, bekker, dammer eller større vannforekomster enn 10 meter i bærvekster og 5 meter i resterende kulturer.

Unngå innånding av aerosoler.

Oppbevares innelåst.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler).

Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).

#### Behandlingsfrist

Frilandsagurk: 4 dager. Jordbær (friland, tunnel, veksthus) og vårløk: 7 dager.

Gulrot, persillerot og pastinakk: 10 dager.

Bønner, ert til konserver, sukkerert, salat, ruccola, kinakål, reddik, knollselleri, stangselleri, kepaløk, sjalottløk, blomkål, brokkoli, hodekål, rosenkål, grønnkål, kruspersille, bladpersille, bringebær på friland, potet: 14 dager.

Raps, rybs, kålrot, nepe, rødbete, forbete, sukkerbete: 30 dager.

Korn og ert til modning: 35 dager.

Purre: 42 dager.

Bringebær i veksthus og plasttunnel: Etter høsting.

REG. NR. 2008.57.14

Avgiftsklasse 2

## Nettoinnhold: 5 L

#### Tilvirker

Syngenta Crop Protection AG  
CH-4002 Basel, Sveits

#### Importør

Syngenta Nordics A/S  
Strandlodsvej 44, 2300 København S, Danmark  
Tel. +45 32 87 11 00



5 707239 400032

Bruksrettledningen må følges, slik at man unngår risiko for menneskers helse og miljøet.

Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist, eller å overskride den tillatte maksimale dosering/konsentrasjon.

## **Bruksområde**

Mot sopp sykdommer på høst- og vårhvete, bygg, rug og rughvete, potet, kepaløk, sjalottløk, vårløk, purre, gulrot, persillerot, kruspersille (friland), bladpersille, pastinakk, stangselleri, knollselleri, blomkål, brokoli, hodekål, rosenkål, grønnkål, kinakål, ruccola, kålrot, nepe, salat på friland, rødbete, reddik, sukkerbete, fôrbete, ert til konserves, sukkererter, erter til modning, bønner, frilandsagurk, raps, rybs samt jordbær og bringebær på friland, plasttunnel og i veksthus.

## **Virkemåte**

Amistar<sup>®</sup> inneholder azoksystrobin som hemmer soppens åndingsprosesser.

Amistar<sup>®</sup> transporteres systemisk oppover i planten og har dessuten en translaminær (bladgjennomtrengende) effekt. Amistar<sup>®</sup> bekjemper soppen mest effektivt før soppen har etablert seg på planten, derfor bør det sprøytes ved begynnende angrep eller når angrep forventes. På visse sopp sykdommer virker Amistar<sup>®</sup> også kurativt f.eks. rust og byggbrunflekk. I tillegg til at Amistar<sup>®</sup> dreper sopp sykdommer effektivt, vil Amistar<sup>®</sup> føre til at planten holder seg lengere grønn. Amistar<sup>®</sup> er ragnfast etter en time.

## **KORN**

### **Bruksrettledning**

Best virkning av Amistar<sup>®</sup> oppnås når sykdommen er på et tidlig utviklingsstadium. Amistar<sup>®</sup> er på grunn av sin gode effekt mot Septoria særlig aktuell å bruke ved begynnende skyting.

Amistar® har lang virkningstid, og beskytter kulturen opp i mot 5-6 uker, avhengig av kornets veksthastighet, sykdomspress og dosering. I forsøkene har bruk av Amistar® ikke forsinket kornets modning. Amistar® er svært skånsom mot kulturen. Dette sammen med en god soppbekjempelse, god langtidseffekt og vedlikehold av plantens grønne bladareal gir høyere merutbytter av god kvalitet.

**Maks en sprøyting pr. sesong når Amistar® brukes alene.**

### Resistensforebygging

Amistar® inneholder et strobilurin og strobiluriner er spesielt utsatt for utvikling av resistens som fører til at preparatet ikke virker lenger. Amistar® bør derfor ikke brukes alene, men blandes med andre effektive midler med annen virkningsmekanisme.

Bruk ikke midler som inneholder strobiluriner mer enn to ganger pr. sesong. Bruk Amistar® ved begynnende angrep eller etter varslings.

KORNART	SYKDOM	DOSERING (ml/daa)	SPRØYTETID
Høst- og vårhvete	Brunrust Gulrust Hveteaksprikk ( <i>Septoria nodorum</i> ) Hvetebbladprikk ( <i>Septoria tritici</i> ) Mjøldogg* Svertesopper	50-100	<b>Ved tidlig angrep:</b> Sprøyt på 4-5 bladstadiet (Z30-31) 60 ml Amistar® + 50 ml Forbel® kan være aktuelt ved tidlig mjøldoggangrep. <b>Ved seint angrep:</b> Full dose ved skyting (Z55) mot <i>Septoria</i> .
Bygg	Brunrust Byggbrunfleck Grå øyeflekk* Mjøldogg* Spraglefleck ( <i>Ramularia</i> )	50-100	<b>Ved tidlig angrep:</b> 4-5 bladstadiet (Z31) 60 ml Amistar® + 50 ml Forbel® kan være aktuelt ved tidlig mjøldoggangrep og angrep av grå øyeflekk. <b>Ved seint angrep:</b> Full dose når angrepet merkes (Z37-49).

KORNART	SYKDOM	DOSERING (ml/daa)	SPRØYTETID
Rug/Rughvete	Brunrust Grå øyeflekk* Mjöldogg* <i>Septoria</i>	50-100	<b>Ved tidlig angrep:</b> 4-5 bladstadiet (Z31) 60 ml Amistar® + 50 ml Forbel® kan være aktuelt ved tidlig mjöldoggangrep og angrep av grå øyeflekk. <b>Ved seint angrep:</b> Full dose når angrepet merkes (Z45-49).
* Ikke fullgod effekt med Amistar® alene. Det er funnet resistens i mjöldogg i Nord-Europa mot strobiluriner, og det anbefales derfor alltid å blande Amistar® med et effektivt middel med en annen virkemekanisme f. eks. Forbel®, når mjöldogg skal bekjempes i kornet.			

## GRØNNSAKER/BÆR/OLJEVEKSTER/POTET

### Bruksretledning

Foreta behandling med Amistar® ved de første symptomer på begynnende angrep, eller foreta en forebyggende behandling når værforholdene gir gode betingelser for angrep.

### Resistensforebygging

Effektiv sykdomsbekjempelse er en kritisk parameter for at unngå oppbygging av resistens. Derfor anbefales det at Amistar® benyttes i tankblanding eller som en del av et sprøyteprogram med andre effektive midler med en annen virkningsmekanisme. For at unngå utvikling av resistens må det ikke fortas mer enn 3 behandlinger med Amistar®.

**Maksimal total dosering er 200 ml/daa pr. sesong.**

Kulturen skal alltid inspiseres for sykdomsangrep umiddelbart før sprøyting.

Det beste resultat opnås ved sprøyting i de tidligste stadier av sykdomsforløpet eller som en forebyggende behandling etter en forutgående varsling eller når værforholdene kan betinge angrep.

Høyeste dose benyttes ved stort smittetrykk, mottagelige sorter og/eller ugunstige sprøyteforhold.

KULTUR	SYKDOM	DOSERING	SPRØYTETID
Løk (kepaløk, sjalottløk, vårløk)	Løkbladskimmel ( <i>Peronospora destructor</i> ) Papirflekk ( <i>Phytophthora porri</i> ) Purpurflekk ( <i>Alternaria porri</i> ) Moderat effekt mot løkbladgråskimmel ( <i>Botrytis squamosa</i> ) Løkgråskimmel ( <i>Botrytis allii</i> )	80-100 ml/daa	Fra 4-6 bladsstadiet. Ved begynnende angrep. 7-14 dagers sprøyteintervall i sprøyteprogram eller i tankblanding. Maksimum 3 sprøytinger med Amistar® og max 200 ml/daa pr. sesong. Fuktige og kjølige værforhold i juli og august gir gode betingelser for angrep av løkbladskimmel.
Purre	Purrerust ( <i>Puccinia porri</i> ) Papirflekk ( <i>Phytophthora porri</i> ) Purpurflekk ( <i>Alternaria porri</i> )	80-100 ml/daa	7-14 dagers sprøyteintervall i sprøyteprogram eller i tankblanding. Maksimum 3 sprøytinger med Amistar® og max 200 ml/daa pr. sesong. Ved kraftige angrep av sykdommer kan korteste sprøyteintervall være nødvendig.
Gulrot, persillerot, pastinakk	Gulrotbladflekk ( <i>Alternaria dauci</i> ), ( <i>Cercospora carotae</i> ) Mjøldogg ( <i>Erysiphe spp.</i> ) Persillebladflekk ( <i>Septoria petroselini</i> )	80-100 ml/daa	7-14 dagers sprøyteintervall i sprøyteprogram eller i tankblanding med annet effektivt middel. Maksimum 2 sprøytinger med Amistar®. Varmt og fuktig vær fremmer angrep av gulrotbladflekk.
Stangselleri, knollselleri, kruspersille, bladpersille	Selleribladflekk ( <i>Septoria apiicola</i> ) Persillebladflekk ( <i>Septoria petroselini</i> )	80-100 ml/daa 8-10 ml/10 l vann og 0,1-0,4 liter væske/m <sup>2</sup> under oppal	7-14 dagers sprøyteintervall i sprøyteprogram eller i tankblanding med annet effektivt middel. Foreta behandling med Amistar® ved de første symptomer på begynnende angrep, eller foreta en forebyggende behandling når værforholdene gir gode betingelser for angrep. Maksimum 2 sprøytinger med Amistar® i felt og 1 sprøyting under oppal.

KULTUR	SYKDOM	DOSERING	SPRØYTETID
Korsblomstred vekster (hodekål, blomkål, brokkoli, rosenkål, grønnkål, kinakål, kålrot, nepe, rucicola)	Skulpesopper ( <i>Alternaria spp.</i> ) Pythium-skulderråte ( <i>Pythium tracheiphilum</i> ) Korsblomstgråflekk ( <i>Pseudosercospora capsellae</i> ) Korsblomstringflekk ( <i>Mycosphaerella brassicae</i> ) Korsblomsthvitrust ( <i>Albugo candida</i> ) Kålbladskimmel ( <i>Peronospora parasitica</i> ) Mjøldogg ( <i>Erysiphe spp.</i> )	80-100 ml/daa  8-10 ml/10 l vann og 0,1-0,4 liter væske/m <sup>2</sup> under oppal	7-14 dagers sprøyteintervall i sprøyteprogram eller i tankblanding med annet effektivt middel. Maksimum 2 sprøytinger med Amistar® i felt og 1 sprøyting under oppal. Foreta behandling med Amistar® ved de første symptomer på begynnende angrep, eller foreta en forebyggende behandling når værforholdene gir gode betingelser for angrep.
Salat på friland	Salatbladskimmel ( <i>Bremia lactucae</i> ) Salatflekk ( <i>Septoria lactucae</i> )	80-100 ml/daa	7-14 dagers sprøyteintervall i sprøyteprogram eller i tankblanding med annet effektivt middel. Maksimum 2 sprøytinger med Amistar®.
Beter (rødbeter, sukkerbeter, førbeter)	Bladfleksjukdommer ( <i>Cercospora beticola</i> ), ( <i>Ramularia beticola</i> ) Beterust ( <i>Uromyces betae</i> ) Moderat effekt mot betemjøldogg ( <i>Erysiphe betae</i> )	80-100 ml/daa	7-14 dagers sprøyteintervall i sprøyteprogram eller i tankblanding med annet effektivt middel. Maksimum 2 sprøytinger med Amistar®.
Reddik på friland	Mjøldogg Kålbladskimmel Skulpesopper Korsblomstgråflekk	80 ml/daa	Maks 1 behandling pr. hold.
Erter og bønner (erter til modning, ert til konserver, sukkererter og alle slag bønner)	Storknollet råtesopp ( <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> ) Mjøldogg ( <i>Erysiphe pisi</i> ) Ertefotsjuka ( <i>Mycosphaerella pinoides</i> ) Erteflekk og brunsjuke ( <i>Ascochyta spp.</i> ) Moderat effekt mot ertebladskimmel ( <i>Peronospora pisi</i> )	50-100 ml/daa	Før åkeren dekker. Spesielt viktig i bladrike sorter. 7-14 dagers sprøyteintervall i sprøyteprogram eller i tankblanding med annet effektivt middel. Maksimum 2 sprøytinger med Amistar®.
Frilandsagurk	Agurkbladflekk Agurkbladskimmel	80-100 ml/daa	Forebyggende behandling med 7-14 dagers mellomrom. Maks 2 behandlinger.

KULTUR	SYKDOM	DOSERING	SPRØYTETID
Raps og rybs	Storknollet råtesopp Gråskimmel	80-100 ml/daa	Forebyggende behandling, ved full blomstring til avsluttende blomstring. Bruk 20-30 l vann/daa.
Potet	Tørrflekksjuke ( <i>Alternaria solani</i> )	30-50 ml/daa	To behandlinger med 7-14 dagers mellomrom. Første behandling ved begynnende angrep. Høyeste dose ved kraftig angrep.
Jordbær på friland, i plasttunnel og i veksthus	Gråskimmel ( <i>Botrytis cineria</i> ) Mjöldogg ( <i>Podosphaera macularis</i> ) Lærråte ( <i>Phytophthora cactorum</i> ) Jordbærøyeflekk ( <i>Mycosphaerella fragariae</i> )	100 ml/100 l vann og 80-100 ml/daa ved dyrking i veksthus annet enn som vanlig radkultur  100 ml/100 l vann pr. 1000 m enkeltrad ved dyrking i radkultur	7-14 dagers sprøyteintervall i sprøyteprogram eller i tankblanding med annet effektivt middel. Maksimum 2 sprøytinger med Amistar®. Foreta behandling med Amistar® ved de første symptomer på begynnende angrep, eller foreta en forebyggende behandling når værforholdene gir gode betingelser for angrep. Behandling mot mjöldogg og gråskimmel kan være aktuelt fra begynnende blomstring til avsluttende blomstring.
Bringebær på friland. <b>Bringebær i veksthus og plasttunnel kun etter høsting.</b>	Gråskimmel ( <i>Botrytis cineria</i> ) Bringebærskuddsjuke ( <i>Didymella applanata</i> ) Flekkskurv ( <i>Elsinoë veneta</i> ) Mjöldogg ( <i>Podosphaera macularis</i> )	100 ml/100 l vann og 80-100 ml/daa ved dyrking i veksthus annet enn som vanlig bringebærhekk  100 ml/100 l vann og 40-50 l pr. 100 m rad i utvokst bringebærhekk	7-14 dagers sprøyteintervall i sprøyteprogram eller i tankblanding med annet effektivt middel. Maksimum 2 sprøytinger med Amistar®. Foreta behandling med Amistar® ved de første symptomer på begynnende angrep, eller foreta en forebyggende behandling når værforholdene gir gode betingelser for angrep. Behandling mot gråskimmel på bærene er aktuelt under blomstringa, mens behandling mot stengelsjukdommer kan være aktuelt fra før blomstring og rett etter avhøsting.

## Sprøyteteknikk

Det anbefales å bruke 20-50 l vann (evt. mer) pr. daa. Høyeste vannmengde anvendes i tette bestand med stor bladmasse.

## Temperatur

Amistar® kan benyttes når dagtemperaturen er over 8-10 grader. Virkningen av produktet er forøvrig ikke særlig temperatur avhengig.

## Nytteorganismer

Amistar® er ikke skadelig for en lang rekke nyttedyr, herunder *Staphylinidae* (rovbiller), *Carabidae* (jordbiller), *Araneae* (edderkopper), *Aphidius* (snylte-vepse), *Coccinillidae* (mariehøner), *Syrphidae* (svirrefluer), *Chrysopidae* (nett-vinger), rovmidd og bier.

## Blandinger

Amistar® er blandbar med Karate® og alle viktige soppmidler, insektsmidler, ugrasmidler, samt mikronæringsstoffer av god kvalitet. Ved tankblanding med Forbel® skal Amistar® tilsettes først og fordeles grundig i sprøytevæsken **før** tilsetning av Forbel®. Kontroller alltid blandingspartnerens anbefalinger vedr. tankmix og deres bruksbegrensninger.

## Forsiktighetsregler

Bruk vernehansker av polykloropren e.l., ansiktsskjerm og overtreksdress ved håndtering og bruk av preparatet. Ved langvarig sprøyting og når det er fare for innånding av damp/sprøytetåke, skal helmaske med kombinasjonsfilter A1/P3 brukes. Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk. Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes. Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00.

## Håndteringsfrist

Hansker og heldekkende arbeidstøy må nyttes dersom en går inn i behandlet område, eller håndterer behandlede plantedeler i en periode på inntil 24 timer etter sprøyting.



## **Rengjøring**

Tomemballasjen skylles minst tre ganger med vann og innholdet tømmes i sprøytetanken. Rester fra sprøytetanken fortynnes omlag 5 ganger med vann og sprøytes ut i henhold til bruksrettledningen. Skyll sprøyteutstyr med vann etter bruk på et sted som ikke gir fare for forurensning av vannforekomster.

Ved skifte av preparat for sprøyting i ømfintlige kulturer må sprøyteutstyret rengjøres med soda, salmiakk eller annet anbefalt vaskemiddel.

## **Avfallshåndtering**

Rengjort emballasje bringes til lovlig avfallsanlegg. Plastemballasje kildesorteres. Konsentrerte preparatrester og ikke rengjort emballasje må innleveres til mottak for farlig avfall.

## **Lagring**

Må oppbevares frostfritt uten å utsettes for direkte sollys.

## **Merk**

Vi garanterer at preparatet holder rett kvalitet. Dette innebærer ingen garanti for at preparatet under alle forhold har forventet virkning. Bruksanvisningen er basert på forsøk og erfaring. Hvis preparatet håndteres eller brukes på annen måte eller under andre vilkår enn angitt på etiketten bortfaller vårt ansvar ved eventuell skade.

*For mere informasjon om produktet se vår hjemmeside [www.syngenta.no](http://www.syngenta.no)*

## **Registrerede varemerker**

*Syngenta Group Company: Amistar<sup>®</sup>, Karate<sup>®</sup>*

*BASF AG: Forbel<sup>®</sup>*




### Azoxystrobin - suspensjonskonsentrat

Mot soppsykdommer på høst- og vårhvete, bygg, rug og rughvete, potet, kepaløk, sjalottløk, vårløk, purre, gulrot, persillerot, kruspersille (friland), bladpersille, pastinakk, stangselleri, knollselleri, blomkål, brokkoli, hodekål, rosenkål, grønnkål, kinakål, ruccola, kålrot, nepe, salat på friland, rødbete, reddik, sukkerbete, fôrbete, ert til konserver, sukkererter, erter til modning, bønner, frilandsagurk, raps, rybs samt jordbær og bringebær på friland, plasttunnel og i veksthus.

Les alltid etiketten nøye for bruk.

**Sammensetning:** Azoxystrobin 250 g/l, fyllstoffer 840 g/l



**UN3082**

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE,  
LIQUID, N.O.S., (AZOXYSTROBIN)

#### ADVARSEL

Inneholder 1,2-benzisothiazol-3-one. Kan gi en allergisk reaksjon.

Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Må ikke brukes nærmere vannførende grøfter, bekker, dammer eller større vannforekomster enn 10 meter i bærvekster og 5 meter i resterende kulturer.

Unngå innånding av aerosoler.

Oppbevares innelåst.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler).

Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).

#### Behandlingsfrist

Frilandsagurk: 4 dager. Jordbær (friland, tunnel, veksthus) og vårløk: 7 dager.

Gulrot, persillerot og pastinakk: 10 dager.

Bønner, ert til konserver, sukkerert, salat, ruccola, kinakål, reddik, knollselleri, stangselleri, kepaløk, sjalottløk, blomkål, brokkoli, hodekål, rosenkål, grønnkål, kruspersille, bladpersille, bringebær på friland, potet: 14 dager.

Raps, rybs, kålrot, nepe, rødbete, fôrbete, sukkerbete: 30 dager.

Korn og ert til modning: 35 dager.

Purre: 42 dager.

Bringebær i veksthus og plasttunnel: Etter høsting.

REG. NR. 2008.57.14

Avgiftsklasse 2

## Nettoinnhold: 5 L

#### Tilvirker

Syngenta Crop Protection AG  
CH-4002 Basel, Sveits

#### Importør

Syngenta Nordics A/S  
Strandlodsvej 44, 2300 København S, Danmark  
Tel. +45 32 87 11 00



5 707239 400032

