

Prosulfokarb - emulsjonskonsentrat

Mot ugras i høstkorn, potet og grasfrøeng.

Les alltid etiketten nøye før bruk.

Sammensetning: Prosulfokarb 800 g/l, fyllstoffer 250 g/l



FARE
Kan være dødelig ved svelging
om det kommer ned i luftveiene.
Irriterer huden.
Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
Gir alvorlig øyeirritasjon.
Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Må ikke brukes nærmere vannførende grøfter, bekker, dammer eller større vannforekomster enn 5 meter.
Giftig for insekter.
Unngå innånding av aerosoler.
VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann.
Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter.
Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller en lege.
IKKE framkall brekning.
Oppbevares innelåst.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler).
Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).

UN3082
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS
SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
(PROSULFOCARB)

Behandlingsfrist:

Potet 6 uker Grasfrøeng (halm til før) 30 uker

REG. NR. 2013.29.17

Avgiftsklasse 3

Nettoinnhold: 10 L

Tilvirker

Syngenta Crop Protection AG, CH-4002 Basel, Sveits

Importør

Syngenta Nordics A/S
Strandlodsvej 44, 2300 København S, Danmark
Tel. +45 32 87 11 00



5 707239 401008



Bruksrettledningen må følges, slik at man unngår risiko for menneskers helse og miljøet. Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist, eller å overskride den tillatte maksimale dosering/konsentrasjon.

BRUKSOMRÅDE OG VIRKEOMRÅDE

I høsthvete, høstbygg, rug og rughvete uten fangvekster om høsten mot grasartene tunrapp og knereverumpe samt tofrøbladete frøugras som vassarve, klengemaure og rødtvetann. Boxer® har også noe virkning mot markrapp.

I potet om våren før spiring mot svartsøtvier, klengemaure og tunrapp.

I grasfrøeng av raigras, rødsvingel og engrapp om høsten mot tunrapp, knereverumpe, klengemaure og andre tofrøbladet frøugras.

Behandlingsfrist

Må i potet ikke behandles senere enn 6 uker før opptaking.

Grasfrøenghalmen kan brukes til før 30 uker etter sprøyting.

VIRKEMÅTE

Boxer er et middel med jord- og bladvirkning. Boxer® tas opp i vekstpunktene både i røtter og skudd og ugraset bekjempes fra spiringsfasen. Virkningen på store ugrasplanter er dårlig. Virkemekanisme er hemming av lipid syntesen - ikke ACCase.

Resistens

Boxer® tilhører den kjemiske gruppen tiokarbamater, HRAC gruppe N. Resistens mot Boxer® er ikke kjent hos ugrasarter i Norge eller i utlandet i ugrasarter som er vanlige her til lands. Ensidig bruk av ett middel, eller en gruppe midler med samme virkningsmekanisme, kan føre til resistens eller nedsatt følsomhet for midlet/middelgruppen. Derfor skal midler fra ulike middelgrupper og/eller alternative bekjempelsesmetoder alltid inngå i bekjempelsesprogrammet. Boxer® er resistensbryter til ALS-hemmere ved bekjemping av vassarve, tunrapp og knereverumpe.

BRUKSRETLEDNING

KULTUR	UGRAS	DOSERING (ml/daa)	SPRØYTETID
Høsthvete, høstbygg, rug og rug hvete uten fangvekster om høsten.	Tunrapp og knereverumpe samt tofrøbladete frøugras som vassarve, klengemaure og rødvetann m.fl.	150-500	Høyeste dose brukes der det er mye ugras samt når det er markrapp og på jord med høyt moldinnhold. Sprøytetidspunkt er fra straks etter såing og frem til kornets treblad stadium (BBCH 00-13). Det optimale sprøytetidspunktet er når sprøytesporene akkurat blir synlige (BBCH 10-11). Det er aktuelt å supplere med sprøyting om våren for å ta vårspirende ugras eller arter som Boxer® ikke virker mot. Boxer® skal ikke brukes i gjenlegg/fangveskter pga. risiko for skade på gjenlegget. Væskemengde 10-40 l/daa. Max 1 behandling.
Potet	Svartsøtvier, klengemaure og tunrapp.	400 eller 2 x 250 evt 200-400 ml Boxer® + 10-20 g Sencor®/daa	Boxer® sprøytes på ferdig-hyppede poteter med fast drill før potetene spirer frem. Høyeste dosering ved mye ugras. Klengemaure med inntil 2 kranser og svartsøtvier med inntil 2 varige blad kan bekjempes med Boxer®. Tørke kan redusere virkningen av Boxer®. Væskemengde 10-40 l/daa. Max 2 behandlinger med 7-10 dagers intervall.
Grasfrøeng av raigras, rødsvingel og engrapp	Tunrapp, knereverumpe, klengemaure og andre tofrøbladete frøugras.	100-150 eller 2 x 75	Boxer® brukes om høsten i veletablerte kulturer (BBCH 21-29): Etter høsting av frøenga, i gjenleggsåret minst 2 måneder etter såing eller etter høsting av dekkveksten. Sprøyting på små planter av kulturen kan gi skade (BBCH < 20). Væskemengde 10-40 l/daa. Max 2 behandlinger med 14 dagers intervall.

VEKSTFORHOLD

Laglig jord (ikke for mye klump) gir best virkning av Boxer®. Kornet skal sås minst 3 cm dypt og være godt dekket av jord. Passende jordfuktighet gir gode virkningsforhold, men Boxer® virker også godt under tørre forhold. Effekten kan reduseres noe på humusrik jord. Etter kraftig regn som gjør at åkeren får oksygenmangel kan en observere forbigående gulning etter bruk av Boxer®. Boxer® bør ikke brukes i perioder med nattefrost.

BRUKSBEGRENSNINGER

Der skal være et intervall på 100 dager før såing/planting av etterfølgende kulturer tilhørende skjermplante-familien unntatt stangselleri, gulrot, knollselleri, pastinakk og persillerot.

TILLAGING AV SPRØYTEVÆSKE

Fyll sprøytetanken halvfull med vann. Tilsett preparatet/preparatene hver for seg. Etterfyll resten av vannet under omrøring. Sprøytevæsken må holdes i kontinuerlig omrøring under tillaging og utsprøyting.

FORSIKTIGHETSREGLER

Bruk vernehansker av neopren, ansiktsskjerm og overtrekksdress ved håndtering og bruk av preparatet. Søl av preparatet på hud må straks skylles eller vaskes av.

Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes.

Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk.

Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftinformasjonen tlf.

22 59 13 00.

HÅNTERINGSFRIST

Anbefalt verneutstyr må nyttes dersom en går inn i behandlet område, eller håndterer behandlede plantedeler i en periode på 48 timer etter sprøyting.

RENGJØRING

Tomemballasjen skylles minst tre ganger med vann og innholdet tømmes i sprøytetanken. Rester fra sprøytetanken fortynnes omlag 5 ganger med vann og sprøytes ut i henhold til bruksrettledningen.

Skyll sprøyteutstyr med vann etter bruk på et sted som ikke gir fare for forurensing av vannforekomster.

Ved skifte av preparat for sprøyting i ømfintlige kulturer må sprøyteutstyret rengjøres med soda, salmiakk eller annet anbefalt vaskemiddel.

AVFALLSHÅNTERING

Rengjort emballasje bringes til lovlig avfallsanlegg. Plastemballasje kildesorteres. Konsentrerte preparatresten og ikke rengjort tomemballasje må innleveres til mottak for farlig avfall.

LAGRING

Oppbevares på et godt ventilert sted. Må oppbevares kjølig, men frostfritt, unngå direkte sollys.

MERK

Vi garanterer at preparatet holder rett kvalitet. Dette innebærer ingen garanti for at preparatet under alle forhold har forventet virkning.

Bruksanvisningen er basert på forsøk og erfaring. Hvis preparatet håndteres eller brukes på annen måte eller under andre vilkår enn angitt på etiketten bortfaller vårt ansvar ved eventuell skade.

For mere informasjon om produktet se vår hjemmeside www.syngenta.no

Registrerte varemerker

Syngenta Group Company: Boxer®

Bayer CropScience AG: Sencor®

Prosulfokarb - emulsjonskonsentrat

Mot ugras i høstkorn, potet og grasfrøeng.

Les alltid etiketten nøye før bruk.

Sammensetning: Prosulfokarb 800 g/l, fyllstoffer 250 g/l



UN3082
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS
SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
(PROSULFOCARB)

FARE

Kan være dødelig ved svelging
om det kommer ned i luftveiene.
Irriterer huden.

Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

Gir alvorlig øyeirritasjon.

Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Må ikke brukes nærmere vannførende grøfter, bekker, dammer eller større vannforekomster enn 5 meter.

Giftig for insekter.

Unngå innånding av aerosoler.

VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann.

Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.

VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter.

Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller en lege.

IKKE framkall brekning.

Oppbevares innelåst.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler).

Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).

Behandlingsfrist:

Potet 6 uker Grasfrøeng (halm til før) 30 uker

REG. NR. 2013.29.17

Avgiftsklasse 3

Nettoinnhold: 10 L

Tilvirker

Syngenta Crop Protection AG, CH-4002 Basel, Sveits

Importør

Syngenta Nordics A/S

Strandlodsvej 44, 2300 København S, Danmark

Tel. +45 32 87 11 00



5 707239 401008

