



Ridomil Gold[®]


MZ Pepite

Metalaksyl-M + Mankozeb - granulat

Mot soppsjukdommer i potet, kepaløk og sjalottløk.

Les alltid etiketten nøye før bruk.

Sammensetning: Metalaksyl-M 38,8 g/kg, mankozeb 640,0 g/kg



ADVARSEL
Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
Mistenkes for å kunne gi fosterskader.
Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Må ikke brukes nærmere vannførende grøfter, bekker, dammer eller større vannforekomster enn 20 meter.
Unngå innånding av aerosoler/støv.
VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann.
Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
Tilsølte arbeidsklær må ikke fjernes fra arbeidsplassen.
Oppbevares innelåst.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk egnet verneutstyr (se siktighetsregler).
Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).

UN3077
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE,
SOLID, N.O.S., (MANCOZEB)

Behandlingsfrist

Potet: 7 dager

Kepaløk og sjalottløk: 14 dager

REG. NR. 2010.3.14

Avgiftsklasse 2

Nettoinnhold: 10 KG

Tilvirker

Syngenta Crop Protection AG
CH-4002 Basel, Sveits

Importør

Syngenta Nordics A/S
Strandlodsvej 44
2300 København S
Danmark
Tel. +45 32 87 11 00



5 707239 400650

Bruksrettledningen må følges, slik at man unngår risiko for menneskers helse og miljøet. Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist, eller å overskride den tillatte maksimale dosering/konsentrasjon.

BRUKSOMRÅDE

Potet, kepaløk og sjalottløk.

VIRKEOMRÅDE

Potettørråte, løkbladskimmel og papirflekk.

BEHANDLINGSFRIST

Potet: 7 dager. Kegaløk og sjalottløk: 14 dager.

VIRKEMÅTE

Ridomil Gold[®] MZ Pepite inneholder to virksomme stoffer, metalaksyl-M og mankozeb. Metalaksyl-M virker systemisk og tas hurtig opp i den grønne planten og transporteres ut til de ytterste bladspissene. Metalaksyl-M bekjemper sykdomsorganismen inne i planten, hemmer soppens vekst og reproduksjon samt beskytter nyttilveksten etter behandling. Mankozeb danner en beskyttende film på bladoverflaten og hemmer spiring av soppsporene. Mankozeb forebygger nye angrep.

RESISTENS

Metalaksyl-M tilhører middelgruppen fenylamid, hvor det lett utvikles resistens. Resistens mot preparatet er kjent i Norge. Derfor skal Ridomil Gold[®] MZ Pepite benyttes kun en gang pr. sesong.

BRUKSRETTLEDNING

KULTUR	DOSERING g/dekar	SPRØYTETID
Potet	200	Ridomil Gold [®] MZ Pepite skal sprøytes forebyggende, senest ved tørråtevarsel og/eller når lokalklimatiske forhold i feltet medfører risiko for tørråtespredning. Ridomil Gold [®] MZ Pepite skal kun benyttes en gang pr. sesong som første eller andre sprøyting. Av hensyn til faren for resistens er det viktig at middelet brukes forebyggende og Ridomil Gold [®] MZ Pepite bør benyttes tidlig i sesongen når planten er i sin mest aktive vekst.
Kegaløk og sjalottløk	250 g	Ridomil Gold [®] MZ Pepite bør brukes når smittetrykket er stort, helst forebyggende og seinest når de første angrep av løkbladskimmel eller papirflekk er synlige i felt. Ridomil Gold [®] MZ Pepite skal kun benyttes en gang pr. sesong.

SPRØYTETEKNIKK

For å redusere avdrift og sikre optimal virkning er det viktig med god nedtrenging slik at ris og stengler blir best mulig dekket av sprøytevæsken.

Bruk 2,5-3,0 bar trykk og 20-40 liter væskemengde pr. dekar.

TILLAGING AV SPRØYTEVÆSKE/SPRØYTETEKNIKK

Fyll tanken halvfull med vann og hell tilmålt mengde Ridomil Gold® MZ Pepite i tanken med røreverket i gang og fyll opp sprøytetanken. Ferdigblandet sprøytevæske bør brukes samme dag.

VÆRFORHOLD

Sprøyt fortrinnsvis på tørre planter, når det er utsikt til noen timers oppholdsvær.

Ridomil Gold® MZ Pepite er regnfast så snart sprøytevæsken har tørket på planten.

Regn 1-2 timer etter sprøyting påvirker derfor ikke resultatet.

TANKBLANDINGER

Ridomil Gold® MZ Pepite er av seneste generasjons granulater. Produktet oppløses hurtig ved omrøring, noe som sikrer jevn konsentrasjon i sprøytevæsken.

Ridomil Gold® MZ Pepite er blandbar med de fleste insektmidler som for eks.

Karate®. Fysisk blandbarhet betyr at det ikke skjer utfelling. Ulike faktorer så som

vannkvalitet, temperatur og hardhet kan innvirke på blandingen. Foreta derfor alltid en prøveblanding først og bland aldri Ridomil Gold® MZ Pepite med mer enn ett middel.

FORSIKTIGHETSREGLER

Bruk vernehansker av polykloropren e.l., ansiktsskjerm og overtrekksdress ved håndtering og bruk av preparatet.

Ved langvarig sprøyting og når det er fare for innånding av sprøytetåke, skal helmaske med kombinasjonsfilter A1/P3 brukes.

Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk.

Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes.

Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00.

HÅNTERINGSFRIST

Anbefalt verneutstyr må nyttes dersom en går inn i behandlet område, eller håndterer behandlede plantedeler i en periode på 24 timer etter sprøyting.

RENGJØRING

Tomemballasjen skylles minst tre ganger med vann og innholdet tømmes i sprøytetanken. Rester fra sprøytetanken fortynnes omlag 5 ganger med vann og sprøytes ut i henhold til bruksrettedningen. Skyll sprøytutstyr med vann etter bruk på et sted som ikke gir fare for forurensing av vannforekomster.

Ved skifte av preparat for sprøyting i ømfintlige kulturer må sprøytutstyret rengjøres med soda, salmiakk eller annet anbefalt vaskemiddel.

AVFALLSHÅNDTERING

Rengjort emballasje bringes til lovlig avfallsanlegg. Plastemballasje kildesorteres. Konsentrerte preparatresten og ikke rengjort emballasje må innleveres til mottak for farlig avfall.

LAGRING

Oppbevares frostfritt.

MERK

Vi garanterer at preparatet holder rett kvalitet. Dette innebærer ingen garanti for at preparatet under alle forhold har forventet virkning. Bruksanvisningen er basert på forsøk og erfaring. Hvis preparatet håndteres eller brukes på annen måte eller under andre vilkår enn angitt på etiketten bortfaller vårt ansvar ved eventuell skade.

For mere informasjon om produktet se vår hjemmeside www.syngenta.no

Registrerte varemerker

Syngenta Group Company: Ridomil Gold[®], Karate[®]



Ridomil Gold[®]

MZ Pepite

Metalaksyl-M + Mankozeb - granulat

Mot soppsjukdommer i potet, kepaløk og sjalottløk.

Les alltid etiketten nøye før bruk.

Sammensetning: Metalaksyl-M 38,8 g/kg, mankozeb 640,0 g/kg

ADVARSEL
Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
Mistenkes for å kunne gi fosterskader.
Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Må ikke brukes nærmere vannførende grøfter, bekker, dammer eller større vannforekomster enn 20 meter.
Unngå innånding av aerosoler/støv.
VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann.
Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
Tilsølte arbeidsklær må ikke fjernes fra arbeidsplassen.
Oppbevares innelåst.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler).
Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).

9
UN3077
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE,
SOLID, N.O.S., (MANKOZEB)

Behandlingsfrist

Potet: 7 dager

Kepaløk og sjalottløk: 14 dager

REG. NR. 2010.3.14

Avgiftsklasse 2

Nettoinnhold: 10 KG

Tilvirker

Syngenta Crop Protection AG
CH-4002 Basel, Sveits

Importør

Syngenta Nordics A/S
Strandlodsvej 44
2300 København S
Danmark
Tel. +45 32 87 11 00



5 707239 400650

