



syngenta.

PLANTEVEKSTREGULATOR

Vekstregulerende middel til bruk på prydplanter i veksthus.

Les alltid etiketten nøye før bruk.

Product names marked ® or ™, the ALLIANCE FRAME, the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON are Trademarks of a Syngenta Group Company

1 L



Paklobutrazol - suspensjonskonsentrat

Vekstregulerende middel til bruk på prydplanter i veksthus.

Les alltid etiketten nøye før bruk.

Sammensetning: Paklobutrazol 4 g/l, fyllstoffer 996 g/l



H411 Giftig med langtidsvirkning, for liv i vann.

P261 Unngå innånding av aerosoler.

P405 Oppbevares innelåst.

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler).

Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).

EUH208 Inneholder 1,2 benzisotiazol-3-on. Kan gi en allergisk reaksjon.

UN3082
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS
SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.,
(PACLOBUTRAZOL)

Nettoinnhold: 1 L

Tilvirker

Syngenta Crop Protection AG
CH-4002 Basel, Sveits

Importør

Syngenta Nordics A/S
Strandlodsvej 44
2300 København S
Danmark
Tel. +45 32 87 11 00

REG. NR. 2013.18.16

Avgiftsklasse 1



5 4707239 400346



Bruksanvisningen må følges, slik at man unngår risiko for menneskers helse og miljøet. Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist, eller å overskride den tillatte maksimale dosering/konsentrasjon.

BRUKSOMRÅDE

Bonzi® er tillatt brukt til vekstregulering av prydplanter i veksthus.

Arter og sorter

Bonzi® er prøvd uten å gi skade i følgende kulturer: *Exacum affine*, *Euphorbia pulcherrima* (julestjerne), *Eustoma grandiflorum*, *Kalanchoe*, Potteroser, *Pelargonium peltatum* og *Solanum pseudocapsicum*.

Tilvirker og importør fraskriver seg ansvar for skader som kan oppstå ved bruk av Bonzi® på arter og sorter som ikke er nevnt ovenfor eller i doseringskjema. For andre prydplanter i potte må en prøvesprøyte for å finne riktig dosering.

Forholdsregler

Bonzi® er kun tillatt brukt i prydplanter i veksthus. Jord/vekstmedium fra behandlede planter må ikke anvendes til etterfølgende kulturer. Under bruken bør det sikres at sprøyte- eller utvanningsvæsken ikke kommer i kontakt med jord/kompost eller andre medier, f.eks. betonggulv som skal anvendes til etterfølgende planter. Visse grønnsakskulturer er ekstremt følsomme overfor Bonzi®. Bonzi® må ikke blandes med andre midler.

Retarderingseffekten ved behandling med Bonzi® varierer avhengig av art, sort, vekststadium og lokale forhold forøvrig. Det anbefales å prøvesprøyte noen få planter med den anbefalte dosering innen bruk i stor skala.

Unngå å sprøyte på våte planter. Bruk ikke Bonzi® på tørre eller på annen måte stressede planter.

Unngå vanning/brusing av bladverket før 24 timer etter sprøyting.

VIRKEMÅTE

Bonzi® tas opp gjennom blad, stengler og røtter. Stoffet transporteres deretter til vekstpunktene og reduserer cellestrekningen slik at det oppnås en kontrollert reduksjon av potteplantenes vegetative vekst. Plantene får mer kompakt vekstform, ofte mørkere bladfarge og for visse planteslag økt ansettelse av blomsterknopper.

NB! Da Bonzi® har en sterk veksthemmende effekt, er det viktig at plantene er i god vekst ved behandlingen.

Ved svak vekst i plantene, tørke eller annen stress er der stor fare for overdosering og vekststans.

BRUKSRETTLEDNING

Bonzi® må bare brukes i veksthus hvor det er ensidig dyrking av prydplanter i brett, pottes og kar.

Se forøvrig under forholdsregler.

TILLAGING AV SPRØYTEVÆSKE OG SPRØYTETEKNIKK

Fyll sprøytetanken halvfull med vann. Tilsett tilmålt mengde Bonzi® og rør godt om. Bruk tilstrekkelig vannmengde til full dekning av plantene, f.eks. 200 L/dekar. Ved vanning bruk 50 ml væske per potte (á 10 cm pottestørrelse). Ved andre pottestørrelser bør mengden reguleres. Bonzi® må ikke blandes med andre midler. Før sprøyting skal voksemediet være oppfuktet og bladene tørre. Bruk ikke Bonzi® på planter som lider av tørke eller er stresset på annen måte.

Doserings skjema:

Art	Konsentrasjon ml/10 l	Metode	Antall behandlinger	Intervall mellom behandlinger	Utviklingstrinn for første behandling
Euphorbia	25 - 50	Sprøyting	1 - 2	5 dager	1 - 6 cm lang
Eustoma	10 - 20	Vanning	1	-	10 - 14 dager etter knip
Exacum affine	25 - 50	Vanning	1	-	2 - 8 cm høye planter

Art	Konsentrasjon ml/10 l	Metode	Antall behandlinger	Intervall mellom behandlinger	Utviklingstrinn for første behandling
Kalanchoe	5	Vanning	1	-	Synlig stor knopp
Kalanchoe	25 - 50	Sprøyting	1	-	Synlig stor knopp
Potteroser	125 - 250	Sprøyting	2 - 3	5 dager	1 - 4 cm lange skudd
Pelargonium	12,5 - 25	Sprøyting	1	-	2 - 3 uker etter potting
Solanum	200 - 400	Sprøyting	2 - 4	10 dager	5 - 7 cm høye planter

FORSIKTIGHETSREGLER

Bruk vernehansker av polykloropren e.l. og heldekkende arbeidstøy ved håndtering og bruk av preparatet. Ved langvarig sprøyting og når det er fare for innånding av damp/sprøytetåke, skal helmaske med kombinasjonsfilter A1/P3 brukes. Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk. Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes. Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00.

RENGJØRING

Tomemballasjen skylles minst tre ganger med vann og innholdet tømmes i sprøytetanken. Rester fra sprøytetanken fortynnes omlag 5 ganger med vann og sprøytes ut i henhold til bruksrettledningen. Skyll sprøyteutstyr med vann etter bruk på et sted som ikke gir fare for forurensning av vannforekomster.

Ved skifte av preparat for sprøyting i ømfintlige kulturer må sprøyteutstyret rengjøres med soda, salmiakk eller annet anbefalt middel.

HÅNTERINGSFRIST

Bruk beskyttende arbeidsklær og hansker ved arbeid med behandlet kultur.

AVFALLSHÅNTERING

Rengjort emballasje bringes til lovlig avfallsanlegg. Plastemballasje kildesorteres. Konsentrerte preparatresten og ikke rengjort emballasje må innleveres til mottak for farlig avfall.

LAGRING

Må oppbevares frostfritt uten å utsettes for direkte sollys.

MERK

Vi garanterer at preparatet holder rett kvalitet. Dette innebærer ingen garanti for at preparatet under alle forhold har forventet virkning. Bruksanvisningen er basert på forsøk og erfaring. Hvis preparatet håndteres eller brukes på annen måte eller under andre vilkår enn angitt på etiketten bortfaller vårt ansvar ved eventuell skade.

For mere informasjon om produktet se vår hjemmeside www.syngenta.no

Registrerede varemerker

Syngenta Group Company: Bonzi®



syngenta.

PLANTEVEKSTREGULATOR

Vekstregulerende middel til bruk på prydplanter i veksthus.

Les alltid etiketten nøye før bruk.

Product names marked ® or ™, the ALLIANCE FRAME, the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON are Trademarks of a Syngenta Group Company

1 L



Paklobutrazol - suspensjonskonsentrat

Vekstregulerende middel til bruk på prydplanter i veksthus.

Les alltid etiketten nøye før bruk.

Sammensetning: Paklobutrazol 4 g/l, fyllstoffer 996 g/l



H411 Giftig med langtidsvirkning, for liv i vann.

P261 Unngå innånding av aerosoler.

P405 Oppbevares innelåst.

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler).

Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).

EUH208 Inneholder 1,2 benzisotiazol-3-on. Kan gi en allergisk reaksjon.

UN3082
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS
SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.,
(PAKLOBUTRAZOL)

Nettoinnhold: 1 L

REG. NR. 2013.18.16

Tilvirker

Syngenta Crop Protection AG
CH-4002 Basel, Sveits

Importør

Syngenta Nordics A/S
Strandlodsvej 44
2300 København S
Danmark
Tel. +45 32 87 11 00

Avgiftsklasse 1



5 707239 400346

