

L162697 NORW/12P PPE 356742



# Stereo® 312.5 EC

syngenta®

**Cyprodinil + propikonazol - emulsjonskonsentrat**  
Mot sopp sykdommer på korn.

Les alltid etiketten nøye før bruk.

Product names marked ® or ™, the ALLIANCE FRAME  
the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON  
are Trademarks of a Syngenta Group Company

5 L

TM



# Stereo® 312.5 EC

## Cyprodinil + propikonazol - emulsjonskonsentrat

Mot sopp sykdommer på korn.

**Sammensetning:** Cyprodinil 250 g/l  
Propikonazol 62,5 g/l

Irriterer luftveiene.

Meget giftig for vannlevende organismer; kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.

Må ikke brukes nærmere vannførende grøfter, bekker, dammer og større vannforekomster enn 30 meter.

Giftig for insekter.

Unngå innånding av sprøytetåke.

Unngå hudkontakt.

Unngå kontakt med øynene.

Ved svelging må ikke brekning fremkalles: Kontakt lege omgående og vis denne etikett eller emballasje.

Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn.

Inneholder cyprodinil og propikonazol.

Inneholder tunge aromatiske hydrokarboner.

Kan gi allergisk reaksjon.

Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler).


Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).



Helseskadelig



Miljøskadelig



ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE,  
LIQUID, N.O.S., (PROPICONAZOLE  
AND CYPRODINIL)

**Behandlingsfrist:** 5 uker

**REG. NR. 2008.1**

Avgiftsklasse 3

**Nettoinnhold: 5 L**

### Tilvirker

Syngenta Crop Protection AG  
CH-4002 Basel, Sveits

### Importør

Syngenta Crop Protection A/S  
Karjolkroken 258, Asper gård  
1820 Spydeberg  
Telefon 41 93 44 43





# Stereo® 312.5 EC

Bruksrettledningen må følges, slik at man unngår risiko for menneske og miljø. Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist, eller å overskride den tillatte maksimale dosering/konsentrasjon.

## **BRUKSOMRÅDE**

Stereo® er tillatt brukt mot soppsykdommer i havre, bygg, høst- og vårhvete, rug og rughvete.

## **BEHANDLINGSFRIST**

Preparatet må ikke brukes senere enn 5 uker før høsting.

## **VIRKEOMRÅDE OG VIRKEMÅTE**

Stereo® er et soppmiddel med systemisk virkning. Middelet inneholder to virkestoffer som virker på forskjellige steder i soppens utvikling. Aktivstoffene opptas hurtig i plantene og fordeles i den oppadgående og utadgående saftstrømmen. Stereo® gir beskyttelse mot soppangrep i opp til 4 uker. Stereo® har virkning mot meldugg, grå øyeflekk, byggbrunflekk, hvetebladprikk, hveteaksprikk, ulike rustsopper og stråknækker.

## **BRUKSRETTLEDNING**

Sprøyt ved tydlige angrep og bruk 150 ml pr. dekar i 20-40 l vann avhengig av sprøyteutstyret. Ved lette angrep kan dosen reduseres, men da reduseres virkningstiden tilsvarende. Maks to behandlinger pr. sesong.

## **BLANDBARHET**

Stereo® kan blandes med andre soppmidler, vekstregulatorer samt pyretrorider og de fleste ugrasmidler unntatt Ally® Class.

## **TILLAGING AV SPRØYTEVÆSKE**

Fyll sprøytetanken halvfull med vann. Tilsett preparatet/preparatene hver for seg. Etterfyll resten av vannet under omrøring. Sprøytevæsken må holdes i kontinuerlig omrøring under tillaging og utsprøyting.

## **FORSIKTIGHETSREGLER**

Bruk vernehansker av polykloropren, øyevern, støvler og overtrekksdress ved håndtering og bruk av preparatet. Ved langvarig sprøyting og når det er fare for innånding av sprøytetåke, skal overtrekksdress og halvmaske med kombinasjonsfilter A1/P2 brukes. Får man stoffet i øynene, skyl straks grundig med store mengder vann og kontakt lege eller Giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00. Ved svelgning må ikke brekning fremkalles: Kontakt lege omgående og vis denne etiketten eller emballasjen. Søl av preparatet på hud må straks skylles eller vaskes av.

Klær tilsølt med preparatet må fjernes straks. Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes. Vask klærne når arbeidet er ferdig.

Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt Giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00.

## **HÅNDTERINGSFRIST**

Anbefalt verneutstyr må nyttes dersom en går inn i behandlet område, eller håndterer behandlede plantedeler i en periode på inntil 24 timer etter sprøyting.

## **RENGJØRING**

Tomemballasjen skylles minst tre ganger med vann og innholdet tømmes i sprøytetanken. Rester fra sprøytetanken fortynnes omlag 5 ganger med vann og sprøytes ut i henhold til bruksrettledningen. Skyll sprøyteutstyr med vann etter bruk på et sted som ikke gir fare for forurensing av vannforekomster.

Ved skifte av preparat for sprøyting i ømfintlige kulturer må sprøyteutstyret rengjøres med soda, salmiakk, eller annet anbefalt middel.

## **AVFALLSHÅNDTERING**

Rengjort emballasje bringes til lovlig avfallsanlegg. Plastemballasje kildesorteres.

Konsentrerte preparatresten og ikke rengjort emballasje må innleveres til mottak for farlig avfall.

## **LAGRING**

Må oppbevares frostfritt uten å utsettes for direkte sollys.

## **MERK**

Vi garanterer at preparatet holder rett kvalitet. Dette innebærer ingen garanti for at preparatet under alle forhold har forventet virkning.

Bruksanvisningen er basert på forsøk og erfaring. Hvis preparatet håndteres eller brukes på annen måte eller under andre vilkår enn angitt på etiketten bortfaller vårt ansvar ved eventuell skade.

*For mere informasjon om produktet se vår hjemmeside [www.syngenta.no](http://www.syngenta.no)*

### **Registrerede varemerker**

*Syngenta Group Company: Stereo®*

*DuPont de Nemours: Ally®*