



Celest[®] Extra

Formula M

syngenta[®]

SOPPMIDDEL

GROUP 3 | 12 FUNGICIDES

SOPPMIDDEL

Flytende beisemiddel til bekjempelse av jord- og frøoverførte soppsykdommer på hvete, bygg, havre, rug og rughvete.

Les alltid etiketten nøye før bruk.

Fludioksonil + Difenokonazol - flytende konsentrat til beising

Sammensetning: Fludioksonil 25 g/l, Difenokonazol 25 g/l,

Fyllstoffer 990 g/l

Tilvirker: Syngenta Crop Protection AG, CH-4002 Basel, Sveits

Importør: Syngenta Nordics A/S, Strandlodsvej 44,
2300 København S, Danmark, Tel. +45 32 87 11 00

Opbevares frostfritt/Oppbevares frostfritt
Förvaras frostfritt/Suojattava pakkaselta

Product names marked ® or ™, the ALLIANCE FRAME
the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON
are Trademarks of a Syngenta Group Company

Nettoinnhold: 50 L

Advarsel

H332 Farlig ved innånding.

H351 Mistenkes for å kunne forårsake kreft.

EUH208 Inneholder 1,2-benzisothiazolin-3-one. Kan gi en allergisk reaksjon.

H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Giftig for fugl.

P201 Innhent særskilt instruks før bruk.

P261 Unngå innånding av aerosoler/støv.

P280 Benytt vernehansker (se forsiktighetsregler).

P304+P340+P312 VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet. Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/ en lege ved ubehag.

P391 Samle opp spill.

P405 Oppbevares innelåst.

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler).

Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).

EUH401 Bruksanvisningen må følges, slik at man unngår risiko for menneskers helse og miljøet.

UFI: T7EA-X0D4-1002-JHTH

REG. NR. 2016.7.25

Avgiftsklasse 1





Celest[®] Extra

Formula M

Bruksrettledningen må følges, slik at man unngår risiko for skade på mennesker og miljø. Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist, eller å overskride den tillatte maksimale dosering/konsentrasjon.

BRUKSOMRÅDE

Celest[®] Extra Formula M er tillatt brukt til beising av såkorn av hvete, bygg, havre, rug og rughvete. Må bare benyttes i godkjente beiseanlegg.

VIRKEOMRÅDE

Celest[®] Extra Formula M er et bredtvirkende beisemiddel med effekt mot spiringsfusarioser (*Fusarium spp.*), stinksot (*Tilletia caries*), stråstot (*Urocystis occulta*) i rug og rughvete, snømugg (*Microdochium nivale*), dvergstinksot (*Tilletia controversa*) i rughvete, naken sot (*Ustilago tritici*) i hvete, naken sot (*Ustilago nuda hordei*) i bygg, bipolaris (*Cochliobolus sativus*), naken sot (*Ustilago avenae*), havrebrunflekk (*Pyrenophora avenae*) i havre.

VIRKEMÅTE

Celest[®] Extra Formula M inneholder det kontaktvirkende stoffet fludioksonil som tilhører den kjemiske gruppen fenylypyrroler, og det systemiske stoffet difenkonazol som er en triazol. Fludioksonil trenger inn i koleoptilen og i kjernens ytterste cellelag og beskytter frøet under spiringsfasen, begynnende rotdanning og danning av første blad. Difenkonazol tas opp i kjernen under behandlingsprosessen og spiringen som beskytter mot smitte i og på frøet og gir en systemisk beskyttelse mot f. eks. dvergstinksot.

BRUKSRETTLEDNING

Celest[®] Extra Formula M brukes uforynnet i kontinuerlig anlegg for flytende beisemidler. Middelet påføres frøet via dyser eller rotasjonsskiver i et sprøytekammer eller i en roterende trommel. For å bedre behandlingsresultatet kan det tilsettes vann, 100-200 ml vann/100 kg såkorn. For rådgiving og tekniske løsninger kontakt importøren. Beiseanlegg med doseringsutstyr kalibreres før beising starter. Temperaturen må være over 0°C ved beising med Celest[®] Extra Formula M.

Beising med Celest[®] Extra Formula M forringer ikke frøets lagerstabilitet eller spireevne i to år, likeså bevarer beisingen sin effekt etter tilsvarende langringsperiode. Behandlet såvare bør dog ikke lagres i mer enn et år. Beiset såvare skal merkes med egen beiseetikett.

DOSERING

Bruk 200 ml/100 kg såvare.

Kornet bør være tørt (<15% vann), være av god kvalitet, godt rensset og fritt for urenheter. Spireevne og beisebehov bør være undersøkt før beising.

FORSIKTIGHETSREGLER

Bruk vernehansker av nitrilgummi, og overtrekksdress ved beising og håndtering av beiset såvare.

Bruk halvmaske med støvfilter P2 ved fare for støv.

Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes.

Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00.

AVFALLSHÅNDTERING

Ubenyttet beiset såvare må innleveres til mottak for farlig avfall. Tomemballasjen og preparatrester må innleveres til mottak for farlig avfall eller returneres importøren.

LAGRING

Lagres frostfritt. Produkt som lagres mer enn seks måneder bør omrøres.

MERK

Vi garanterer at preparatet holder rett kvalitet. Dette innebærer ingen garanti for at preparatet under alle forhold har forventet virkning. Bruksanvisningen er basert på forsøk og erfaring. Hvis preparatet håndteres eller brukes på annen måte eller under andre vilkår enn angitt på etiketten bortfaller vårt ansvar ved eventuell skade.

Minimum to års holdbarhet.

For ytterligere informasjon om produktet se vår hjemmeside www.syngenta.no

Registrerte varemerker

Syngenta Group Company: Celest®

