

KRAFTEN AV TO

Evagio Forte gir meget god beskyttelse mot tørråte i ris og knoller på grunn av de to kompletterende aktive ingrediensene.

BRED BESKYTTELSE OG GOD ANTI-RESISTENSSTRATEGI MED



Ny tilvekst

Kombinasjon av høy translaminær og kontaktvirkende effekt sikrer effektivt beskyttelse av ny tilvekst i planten

Tørråte i riset

Sterk effekt og meget god regnfasthet beskytter potetplantene gjennom regnværs perioder med høyt smittepress

Tørråte på knollene

Kombinasjon av komponenter med sterk effekt mot tørråte i riset og en komponent med høy effekt mot zoosporer sikrer god beskyttelse mot tørråte i knollene

INNHold	200 g/l Mandipropamid + 100 g/l Amisulbrom
FORMULERING	SC
BEHANDLINGSTIDSPUNKT	Forebyggende mot tørråte i potet fra radlukking og fram til avmodning, BBCH 51- 89
DOSERING	60 ml/daa
ANTALL BEHANDLINGER	3*
BEHANDLINGSINTERVALL	Minimum 6 dager
BEHANDLINGSFRIST	7 dager

*Maks 6 behandlinger totalt med Mandipropamid (Evagio Plus, Revus, Revus Pro, Revus Top)

Bruk og behandling

Evagio Forte anbefales som forebyggende behandling mot tørråte i potet. Den kan med fordel brukes gjennom sesongen fra radlukking for å beskytte riset mot tørråte og i slutten av sesongen for også å beskytte mot tørråte på knollene.



syngenta[®]


Les alltid etiketten og opplysninger om produktet før bruk. Vær oppmerksom på advarselsetninger og advarselssymboler, som fremgår av etiketten.

Syngenta Nordics A/S
Tuverudveien 29, 3426 aullaug, Norge
www.syngenta.no

SLIK FUNGERER EVAGIO FORTE

Mandipropamid er effektiv mot Oomyceter, slik som tørråte. Den aktive substansen tas opp via plantenes vokslag og er regnfast så snart sprøytevæsken tørker inn på bladene og forhindrer inntrenging og mycelvekst i planten. Gjennom mandipropamids translaminære egenskaper beskyttes også undersiden av bladet. Amisulbrom har en god kontaktvirkende effekt som kompletterer mandipropamids translaminære effekt og motvirker i tillegg angrep i knollene i slutten av sesongen.

Ulike stadier i livssyklusen til tørråte som de to aktive ingrediensene virker på



- 1 Mandipropamid og Amisulbrom motvirker infeksjon av sporer på bladet
- 2 Motvirker myceltilvekst inn i bladet og beskytter også undersiden av bladet
- 3 Effekt på zoosporenes motilitet av amisulbrom motvirker tørråte på knollene

Kraftig angrep av tørråte i ubehandlet rute av forsøk



60 ml/daa Evagio Forte kontrollerer tørråteangrepet effektivt i samme forsøk

